

COGNOME _____
NOME _____
MATRICOLA

--	--	--	--	--	--

NON SCRIVERE QUI

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

UNIVERSITÀ DI TRENTO — FACOLTÀ DI SCIENZE COGNITIVE

CDL IN SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA COGNITIVA

VERIFICA SETTIMANALE DI ANALISI MATEMATICA

A.A. 2010-2011 — ROVERETO, 15 NOVEMBRE - 19 NOVEMBRE 2010

Riempite questo foglio scrivendo in stampatello cognome, nome e numero di matricola. Svolgete gli esercizi prima in brutta, poi copiateli ordinatamente su un foglio di protocollo (su cui avete scritto in stampatello cognome, nome e numero di matricola) e riconsegnate questo foglio insieme all'elaborato alla prima lezione di settimana prossima. Non usate il colore rosso.

- 1) Risolvete in \mathbb{R} le seguenti equazioni:

$$x^2 \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{2} + x \log \frac{1}{e^2} = \log_3 1; \quad \frac{3^{x^2} \cdot 3}{3^{2|x|}} = 1; \quad 5^x \left(\frac{1}{5}\right)^{|x+1|} = 125^{-1}.$$

- 2) Risolvete in \mathbb{R} le seguenti disequazioni:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x^3-x} > 1; \quad 2^{-x} \cdot 2^{-x^2+4} < 4^x; \quad 3^{2x-x^2} - \left(\frac{1}{3}\right)^{-x} > 0; \quad \log |x| \leq 0;$$
$$\log_{\frac{1}{4}}(|x+1|+1) > -1; \quad \log_2(x^2-4) < 5; \quad \log(x^2+x) \leq -\log\left(\frac{1}{2|x|}\right).$$

- 3) Rappresentate graficamente, nei loro insiemi di definizione, le seguenti funzioni:

$$\left|\left(\frac{1}{2}\right)^x - 1\right|; \quad |\log_2(x-2) - 2|; \quad \left|\log_{\frac{1}{4}} x + 1\right|; \quad |4 - 2^{|x|}|.$$

- 4) i) Rappresentate graficamente la funzione $f:]-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} \log_2(x+2) & \text{se } -2 < x < -1 \\ |x-1| & \text{se } -1 \leq x \leq 2 \\ 2^x - 3 & \text{se } x > 2. \end{cases}$$

- ii) f soddisfa le ipotesi del teorema di Weierstrass su $[-1, 1]$? E su $[-\frac{3}{2}, 1]$? Determinate, se esistono, il massimo (p.ti di massimo) e il minimo (p.ti di minimo) di f su $[-1, 1]$ (rispettivamente su $[-\frac{3}{2}, 1]$).

- iii) f soddisfa le ipotesi del teorema di esistenza degli zeri su $[-\frac{3}{2}, 1]$?

- iv) Calcolate $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$.

- 5) Provate che l'equazione $x^4 = 3x + 1$ ha una soluzione $x_0 \in [-1, 0]$. Essa è unica? Usando il metodo della bisezione determinate un intervallo $]\tilde{a}, \tilde{b}[\subset]-1, 0[$ tale che $x_0 \in]\tilde{a}, \tilde{b}[$ e $\tilde{b} - \tilde{a} \leq \frac{1}{4}$.

6) Deducete dal grafico di $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ii) il segno di f e rappresentatelo sulla retta reale;

iii) i punti di discontinuità di f ;

iv) l'eventuale massimo e minimo di f su $[-2, -1]$ (resp. su $[-2, 2]$). Dite se f soddisfa le ipotesi del teorema di Weierstrass nell'intervallo $[3, 4]$.

