

Commenti alla lezione del 6/12/2005 (20^a lezione Corso)

Riferimento bibliografico : [2] Cap. 4 Sez. 4.2 (pag. 138 ; ultimo paragrafo)

appendice Cap. 4 [4.3] (pag. 193 ; prima metà
Teorema A4.6)

Cap. 4 Sez. 4.7 (studio qualitativo delle funzioni)

Derivate di ordine superiore

Def. Se $f:]a,b[\rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile, allora è definita la funzione derivata (prima) dif, $f':]a,b[\rightarrow \mathbb{R}$. Se f' a sua volta è derivabile in $]a,b[$, la sua derivata si chiama derivata seconda dif:
 $f'':]a,b[\rightarrow \mathbb{R}$ $f''(x) = (f'(x))'$ $\forall x \in]a,b[$.

Notazione : $f''(x)$; $\frac{d^2 f}{dx^2}(x)$; $D^2 f(x)$; $\ddot{f}(x)$.

OSS. Se $f'':]a,b[\rightarrow \mathbb{R}$ è a sua volta derivabile, allora possiamo definire la funzione derivata terza dif : $f''' :]a,b[\rightarrow \mathbb{R}$
 $f'''(x) = (f''(x))'$

notazione : $f'''(x) = f^{(3)}(x)$; e così via ... derivata n-esima
 $f^{(n)} :]a,b[\rightarrow \mathbb{R}$...

□

Esercizio 1. Calcolate la derivata seconda, dove esiste, delle seguenti funzioni :

i) $f(x) = x^2$; ii) $f(x) = e^x$; iii) $f(x) = \log x$;

iv) $f(x) = x^2 e^{x+1}$ v) $f(x) = (x+1) \log(1+x^2)$ vi) $f(x) = \sqrt[3]{1+3x}$

Svolgimento:

i) $f(x) = x^2$: $\text{dom } f' = \mathbb{R}$ $f'(x) = 2x$
 $\text{dom } f'' = \mathbb{R}$ $\underline{f''(x) = 2}$ □

ii) $f(x) = e^x$: $\text{dom } f' = \mathbb{R}$ $f'(x) = e^x$
 $\text{dom } f'' = \mathbb{R}$ $\underline{f''(x) = e^x}$ □

iii) $f(x) = \log x$: $\text{dom } f' =]0, +\infty[$ $f'(x) = \frac{1}{x}$
 $\text{dom } f'' =]0, +\infty[$ $\underline{f''(x) = -\frac{1}{x^2}}$ □

iv) $f(x) = x^2 e^{x+1}$: $\text{dom } f' = \mathbb{R}$ $f'(x) = 2xe^{x+1} + x^2 e^{x+1}$
 $\text{dom } f'' = \mathbb{R}$ $f''(x) = e^{x+1}(2+x) + xe^{x+1}(2+x) +$
 $+ xe^{x+1}$
 $\underline{f''(x) = e^{x+1}(2+4x+x^2)}$ □

v) $f(x) = (x+1) \log(1+x^2)$: $\text{dom } f' = \mathbb{R}$ $f'(x) = \log(1+x^2) + (x+1) \cdot \frac{2x}{1+x^2}$

$$\text{dom } f'' = \mathbb{R} \quad f''(x) = \frac{2x}{1+x^2} + \frac{[2x(x+1)]' (1+x^2) - 2x(x+1)2x}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{2x}{1+x^2} + \frac{(4x+2)(1+x^2) - 4x^3 - 4x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{2x}{1+x^2} + \frac{4x^3 + 4x^2 + 2 + 2x^2 - 4x^3 - 4x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{2x(1+x^2) - 2x^2 + 4x + 2}{(1+x^2)^2}$$

$$\underline{f''(x) = \frac{2x^3 - 2x^2 + 6x + 2}{(1+x^2)^2}}$$
 □

vi) $f(x) = x^2 \sqrt{1+3x}$

$$\begin{aligned} \text{dom } f' &= \{x \in \mathbb{R} : 1+3x > 0\} \\ &= \left] -\frac{1}{3}, +\infty \right[\end{aligned}$$

$$f'(x) = 2x\sqrt{1+3x} + \frac{3x^2}{2\sqrt{1+3x}}$$

$$\text{dom } f'' = \left] -\frac{1}{3}, +\infty \right[$$


$$\begin{aligned} f''(x) &= 2\sqrt{1+3x} + \frac{2x \cdot 3}{2\sqrt{1+3x}} + \left(\frac{3x^2}{2\sqrt{1+3x}} \right)' \\ &= 2\sqrt{1+3x} + \frac{3x}{\sqrt{1+3x}} + \frac{3}{2} \left(\frac{2x\sqrt{1+3x} - 2\sqrt{1+3x}}{1+3x} \right) \\ &= 2\sqrt{1+3x} + \frac{3x}{\sqrt{1+3x}} + \frac{3}{2} \left(\frac{4x(1+3x) - 3x^2}{(\sqrt{1+3x})^3} \right) \\ &= \frac{2+9x}{\sqrt{1+3x}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{9x^2+4x}{(\sqrt{1+3x})^2}. \end{aligned}$$

■


Funzione convessa (concava). Punto di flesto

Def. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile. Se il grafico di f si mantiene sopra la retta tangente al grafico in ogni suo punto, allora f si dice convessa.

Se il grafico di f si mantiene sotto la retta tangente al grafico in ogni suo punto, allora f si dice concava.



f è convessa



f è concava

□

Def. Se $x_0 \in]a,b[$, ed esiste un intorno destro (sinistro) di x_0 in cui f è convessa e un intorno sinistro (destro) di x_0 in cui f è concava, allora x_0 si dice un punto di flesso.

Proposizione: Sia $f :]a,b[\rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte in $]a,b[$; allora

$$f'' \geq 0 \text{ in }]a,b[\Rightarrow f \text{ convessa in }]a,b[$$

$$f'' \leq 0 \text{ in }]a,b[\Rightarrow f \text{ concava in }]a,b[.$$

Esempi:

i) $f(x) = x^2$ su \mathbb{R} è convessa: infatti $f'(x) = 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}$




□

$f(x) = x^n$ su \mathbb{R} , con n pari, è convessa: infatti $f'(x) = nx^{n-1}$



$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

ii) $f(x) = e^x$ su \mathbb{R} è convessa: infatti $f'(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$



□

iii) $f(x) = x^3$ su \mathbb{R} è concava su $]-\infty, 0]$ e convessa su $[0, +\infty[$:



Studio qualitativo di una funzione (schema per la determinazione
del grafico di una funzione).

Passemo ora ad indicare quali sono i punti più importanti per affrontare uno studio qualitativo di una funzione f . Voglio sottolineare che lo schema proposto qui di seguito è solo orientativo; infatti talvolta non tutti i punti elencati mi servono e sviluppare con calcoli esplicativi (e quindi mi ometto) e mi occuperò allora di determinare il comportamento della funzione attraverso i soli punti svolti.

1. determinazione del $\text{dom}(f)$: (dominio, insieme di definizione di f)
se non esplicitamente assegnato
ricerca di eventuali simmetrie (funzioni pari, dispari)
2. Studio del segno di f : determinare gli intervalli dove $f > 0, f < 0, f = 0$.
3. comportamento della funzione agli estremi di $\text{dom}(f)$:
limiti; asintoti
(per evitare di dimenticare l'analisi di qualche punto di frontiera conviene, ad esempio procedendo da $-\infty$ a $+\infty$, determinare per ordine tali punti e calcolare i rispettivi limiti uno per uno).
4. continuità: si determinano gli eventuali punti in cui f risulta discontinua. Se x_0 è un pt. di discontinuità di f si calcolano (se esistono) i limiti sinistro e destro di f in x_0 .
5. determinazione del $\text{dom}(f')$ ⊂ $\text{dom} f$, e si calcola le derivate f'
si determinano gli eventuali punti critici (necessari)

della f e si determina la loro natura in base allo studio del segno di f' , cioè in base alle monotonia di f .

Eventualmente si può calcolare $\lim f'$ negli estremi di $\text{dom}(f')$ per individuare eventuali cuspidi, flessi e tangenti verticali.

6. studio della convessità o concavità della f : si ricerca $\text{dom}(f'')$ e si studia il segno di f'' . Si determinano eventuali punti di flesso.

Delle volte accade che la risoluzione della disequazione $f''(x) \geq 0$ è piuttosto complessa; in questi casi si cerca di determinare il comportamento qualitativo della funzione f attraverso le informazioni ottenute nei punti precedenti.

7. si traccia un grafico qualitativo della funzione f che tenga conto delle informazioni ricavate nei punti precedenti.

Esercizio 1. Tracciate un grafico approssimativo della funzione

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} .$$

Svolgimento:

1. $\text{dom } f = \mathbb{R}$; inoltre f è pari (quindi il grafico risulta simmetrico rispetto all'asse y); basta studiare f solo su $]-\infty, 0] \cup [0, +\infty[$) \square

2. $f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (il grafico di f si trova tutto sopra l'asse delle x) \square

3. $\text{dom } f = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$: determiniamo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Rightarrow y=0 \text{ è asintoto orizzontale per } f \text{ per } x \rightarrow -\infty \text{ e per } x \rightarrow +\infty.$$


□

4. f è continua essendo rapporto di funzioni continue e il denominatore non ci annulla mai.

□

5. $\text{dom } f' = \mathbb{R}$; inoltre $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$

Allora $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x=0$ pt. critico.




Dalla monotonia della f segue che $x=0$ è un pt. di massimo locale (stretto) per f ; anti, sarà massimo di f su tutto \mathbb{R} .

□

6. $\text{dom } f'' = \mathbb{R}$ $f''(x) = \frac{-2(x^2+1)^4 + 2x \cdot 2(x^2+1)^2 \cdot 2x}{(x^2+1)^6} = \frac{-2x^2 - 2 + 8x^2}{(x^2+1)^3}$

$$= \frac{6x^2 - 2}{(x^2+1)^3}$$



$\Rightarrow x = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ sono pt. di flebo

□

7.




grafico approssimativo dif.


Esercizio 2. Tracciate un grafico approssimativo della funzione

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

Svolgimento:

1. $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ (infatti deve essere $x^2 - 1 \neq 0$) □

2. studio del segno di f :



3. abbiamo $\text{dom } f =]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, +\infty[$: allora

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Si ha allora che $x = -1$, $x = 1$ sono asintoti verticali per f

$y = 0$ è asintoto orizzontale per f . □

4. In tutti i punti del suo dominio f è continua se e solo se i punti di discontinuità sono punti di discontinuità di funzioni continue.

5. $\text{dom } f' = \text{dom } f$ e si ha

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 1) - x \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2}$$

Notiamo $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \text{dom } f'$

$$\begin{array}{ccccccc} - & - & 0 & - & - & 0 & - \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ f'(x) & & f(x) & & & & \end{array}$$

□


6. $\text{dom } f'' = \text{dom } f$ e mica

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-2x(x^2-1)^2 + (x^2+1)2(x^2-1)2x}{(x^2-1)^3} = \\ &= \frac{-2x^3 + 2x + 4x^3 + 4x}{(x^2-1)^3} = \\ &= \frac{2x^3 + 6x}{(x^2-1)^3} = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccccc} - & - & - & + & + & + & 2x \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & & \\ + & + & 0 & - & - & 0 & + + \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & & \\ \hline - & - & 0 & + & - & 0 & + + \\ -1 & 0 & 1 & & & & \\ \hline f''(x) & & & & & & \end{array}$$

∩ ∪ ∩ ∪ f(x) □

7.



□