

Commenti alla lezione del 30/11/2005 (18ª lezione Corso)


Riferimento bibliografico: [2] Cap. 4 Sez. 4.1 (pag. 137, Def., Prop. 4.1
pag. 138: esempi e definizioni).

Sez. 4.2 (pag. 139: Prop. 4.2
Corollario 4.3).


Derivate

Affrontiamo ora lo studio del comportamento locale (cioè nell'intorno di un punto assegnato) delle funzioni di una variabile reale.


Se una funzione f è continua in un punto x_0 e si ha $f(x_0) = y_0$, la sola conoscenza del valore y_0 rende ovviamente possibile un'ampia varietà di comportamenti della funzione f nelle vicinanze del punto x_0 ; ad esempio, la condizione $f(0) = 0$ non identifica il comportamento di f fra i tre seguenti:



x^3 è "piatto" in 0



$\sqrt[3]{x}$ è "ripida"




x è intermedia

Per uno studio più dettagliato (per un'analisi locale della f intorno a x_0), è necessario introdurre la nozione di derivata.

Studieremo poi le regole di derivazione delle funzioni elementari ed i risultati più importanti riguardanti le funzioni derivabili. Infine applicheremo tali risultati allo studio qualitativo delle funzioni di una variabile reale.

Per capire come si comporta una funzione $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ in un intorno di un punto $x_0 \in]a, b[$, andiamo ad indagare come "varia la quota al variare del percorso".

Es. 1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \text{costante} = c$. Fissato $x_0 \in \mathbb{R}$ (qualsiasi),




consideriamo $h \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$; per esempio $h > 0$. Allora abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{\text{variazione di quota}}{\text{variazione di percorso}} &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{x_0+h - x_0} = \\ &= \frac{c - c}{h} = 0 \quad \forall h > 0 \end{aligned}$$

(analog. per $h < 0$); quindi non abbiamo variazione di quota al variare del percorso (ovvio!) (la pendenza della retta tangente al grafico di f nel pt. $(x_0, f(x_0))$ — che coincide con il grafico! — è 0) \square

Es. 2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = ax + b$ (funzione affine). Fissato $x_0 \in \mathbb{R}$



(qualsiasi), consideriamo $h \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$; per esempio $h < 0$ (per ricordarci che h può essere sia positivo che negativo; vogliamo studiare il comportamento di f sia in un intorno destro ($h > 0$) che in un intorno sinistro ($h < 0$) di x_0). Allora abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{\text{variazione di quota}}{\text{variazione di percorso}} &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{x_0+h - x_0} = \frac{a(x_0+h) + b - ax_0 - b}{h} = \\ &= \frac{ax_0 + ah - ax_0}{h} = a \quad \forall h < 0 \end{aligned}$$

(analog. per $h > 0$); quindi il rapporto $\frac{\text{variazione di quota}}{\text{variazione di percorso}}$ è costante


è uguale ad a (la pendenza della retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$ - che coincide con il grafico di f - è a).



Es. 3 Sia $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in]a, b[$; sia $h \in \mathbb{R}$ $h \neq 0$

t.c. $x_0 + h \in]a, b[$. Supponiamo

$h > 0$ (analog. per $h < 0$)




Si ha

$$\frac{\text{variazione di quota}}{\text{variazione di percorso}} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

= rapporto incrementale di f nel pt. x_0

= coefficiente angolare della retta
passante per i punti $A = (x_0, f(x_0))$
e $B = (x_0 + h, f(x_0 + h))$.

Per descrivere il comportamento della f vicino a x_0 ovviamente siamo interessati ad h piccoli !! Quindi facciamo tendere $h \rightarrow 0$! (sia $h \rightarrow 0^+$ che $h \rightarrow 0^-$!).



Questo significa geometricamente
che il punto B si muove verso il
punto A (che rimane fisso) mantenendosi
sul grafico di f .

La pendenza della retta AB

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

varia, la sua pendenza assestandosi su una posizione limite; essa prende il nome di derivata (prima) di f nel punto x_0 , e la retta limite il nome di retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$.

Abbiamo allora

eq. retta passante per A e B : $y = f(x_0) + \underbrace{\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}}_{h \rightarrow 0} \cdot (x - x_0)$

(se \exists finito il limite)

eq. retta tangente al

grafico di f in $(x_0, f(x_0)) = A$:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

□

Def. Sia $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$. f si dice derivabile in $x_0 \in]a, b[$ se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} ;$$

tale limite indichiamo con $f'(x_0)$ [\doteq derivata di f in x_0].

La retta di equazione

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

si chiama retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$.

Notazione : oltre a $f'(x_0)$ si usano i simboli $\frac{df}{dx}(x_0)$, $Df(x_0)$, $\dot{f}(x_0)$.

NOTA: Se $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \begin{matrix} +\infty \\ (-\infty) \end{matrix}$, useremo ancora

la notazione $f'(x_0) = \begin{matrix} +\infty \\ (-\infty) \end{matrix}$, cioè la derivata di f in x_0 è

$\begin{matrix} +\infty \\ (-\infty) \end{matrix}$, ma la funzione non è derivabile in x_0 (vedi pt. b) pag. 205).

Def. Se $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in ogni punto x di $]a, b[$, allora è definita la funzione derivata

$$f':]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f'(x).$$

Def. Se esistono, i limiti


$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad , \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

vengono chiamati rispettiv. derivata sinistra e derivata destra di f in x_0 e scriviamo rispettiv.

$$f'_-(x_0) \quad \quad f'_+(x_0).$$

Punti di non derivabilità di una funzione

a) Punto angoloso: f è continua in x_0 , sono finiti $f'_-(x_0), f'_+(x_0)$, ma $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$.




$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1.$$

"La funzione $|x|$ cambia troppo bruscamente vicino a 0 nel passaggio da $h < 0$ ad $h > 0$; quindi la funzione non è derivabile in $x=0$."



b) Punto a tangente verticale : f è continua in x_0 , e $f'(x_0) = \begin{matrix} +\infty \\ (-\infty) \end{matrix}$.

Esempio: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$.




Infatti
$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = +\infty.$$



c) Cuspide : f è continua in x_0 , e $f'_-(x_0) = \begin{matrix} -\infty \\ (+\infty) \end{matrix}$, $f'_+(x_0) = \begin{matrix} +\infty \\ (-\infty) \end{matrix}$

Esempio: $f(x) = \sqrt[3]{|x|}$ ha una cuspide in $x_0 = 0$.



Infatti

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{|h|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\sqrt[3]{h}}{h} = -\infty,$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{|h|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = +\infty.$$



Prop. Se f è derivabile in $x_0 \in]a, b[$, allora f è continua in x_0 .

Nota: il viceversa non è vero; vedi gli esempi sopra.

Derivate di funzioni elementari

Raccogliamo nel seguito le derivate delle funzioni elementari più comunemente usate riportando il loro dominio naturale:

	$f(x)$	$f'(x)$
	costante (\mathbb{R})	0 (\mathbb{R})
	x (\mathbb{R})	1 (\mathbb{R})
$n \in \mathbb{N}$	x^n (\mathbb{R})	$n x^{n-1}$ (\mathbb{R})
$n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{x^n}$ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$ $(\mathbb{R} \setminus \{0\})$
$\alpha \in \mathbb{R}$	x^α $(x > 0)$	$\alpha x^{\alpha-1}$ $(x > 0)$
$a > 0$	a^x (\mathbb{R})	$a^x \log a$ (\mathbb{R})
$a > 0$ $a \neq 1$	$\log_a x$ $(x > 0)$	$\frac{1}{x \log a}$ $(x > 0)$

caso speciale: $(e^x)' = e^x$

caso speciale: $(\log x)' = \frac{1}{x}$

Proviamo alcuni di questi risultati:

i) $f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

Infatti, sia $x \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Allora, $\forall h \neq 0$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{x+h - x}{h} = 1$$

Quindi $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 1.$

□

ii) $f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

Infatti, sia $x \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Allora, $\forall h \neq 0$

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ = 2xh + h^2.$$

$$\text{Quindi } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = 2x.$$

□

$$\text{iii) } f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Infatti, sia $x \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Allora, $\forall h \neq 0$

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \frac{e^x(e^h - 1)}{h}.$$

Ricordando il limite notevole $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$, si

ottiene

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x.$$

■

NOTA: Possiamo allora dire che per $f(x) = x^3$ abbiamo $f'(x) = 3x^2$ e dunque $f'(0) = 0$; quindi la retta tangente al grafico di f in $(0,0)$ è $y = 0$. Per la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x}$ si ha $f'(0) = +\infty$ (vedi b) a pag. 205) (ossia la retta tangente al grafico di f in $(0,0)$ coincide con la retta $x = 0$), e per la funzione $f(x) = x$ si ha $f'(0) = 1$: dunque la derivata permette di distinguere i tre comportamenti segnalati nell'introduzione alla derivata a pag. 200.

Esercizio 1. Determinate l'equazione della retta tangente al grafico delle seguenti funzioni

i) $f(x) = e^x$ nel punto $(x_0, f(x_0)) = (0, 1)$

ii) $g(x) = x^3$ nel punto $(x_0, g(x_0)) = (1, 1)$

iii) $h(x) = \log x$ nel punto $(x_0, h(x_0)) = (e, 1)$

e rappresentatela graficamente insieme alla funzione.


Svolgimento:

i) $f'(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$; $f'(0) = e^0 = 1$. Quindi

$$y = f(0) + f'(0)(x-0), \text{ da cui}$$

$$y = 1 + 1 \cdot x, \text{ ossia}$$

$$\Rightarrow \underline{y = x + 1}.$$




ii) $g'(x) = 3x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$; $g'(1) = 3$. Quindi

$$y = g(1) + g'(1)(x-1), \text{ da cui}$$

$$y = 1 + 3(x-1), \text{ ossia}$$

$$\Rightarrow \underline{y = 3x - 2}.$$




iii) $h'(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x > 0$; $h'(e) = \frac{1}{e}$. Quindi

$$y = h(e) + h'(e)(x-e), \text{ da cui}$$

$$y = 1 + \frac{1}{e}(x-e), \text{ ossia}$$

$$\Rightarrow \underline{y = \frac{x}{e}}.$$



Regole di calcolo differenziale

Teorema (algebra delle derivate): Siano $f, g:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in $]a, b[$.

Allora $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ ($g \neq 0$) sono derivabili in $]a, b[$ e valgono

le seguenti formule:

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(f \cdot g)' = f'g + fg' \quad ; \text{ in particolare } (kf') = kf' \quad \forall \text{ costante } k \in \mathbb{R}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad \text{in ogni punto in cui } g \neq 0.$$

Esercizio 2. Calcolate le seguenti derivate (dove esistono):

i) $(x^2 + \frac{1}{x})' = (x^2)' + (x^{-1})' = 2x - x^{-2} = 2x - \frac{1}{x^2}.$ □

ii) $(e^x + x^3)' = (e^x)' + (x^3)' = e^x + 3x^2.$ □

iii) $(\log x + x^{\frac{1}{2}})' = (\log x)' + (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}.$ □

iv) $(e^x x^3)' = (e^x)' x^3 + e^x (x^3)' = e^x x^3 + 3x^2 e^x$
 $= e^x x^2 (x + 3)$ □

v) $\left(\frac{x^3}{e^x}\right)' = \frac{(x^3)' e^x - x^3 (e^x)'}{(e^x)^2} = \frac{3x^2 \cancel{e^x} - x^3 \cancel{e^x}}{(e^x)^2} =$
 $= \frac{3x^2 - x^3}{e^x}.$ □

vi) $\left[\left(x^2 + \frac{1}{x}\right) \log x\right]' = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)' \log x + \left(x^2 + \frac{1}{x}\right) (\log x)' =$
 $= \left(2x - \frac{1}{x^2}\right) \log x + \left(x^2 + \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{1}{x}.$ □

vii) $\left(\frac{\log x}{e^x + 1}\right)' = \frac{(\log x)' (e^x + 1) - (\log x) (e^x + 1)'}{(e^x + 1)^2} = \frac{\frac{1}{x} (e^x + 1) - (\log x) e^x}{(e^x + 1)^2}.$ ■