

**Esercizi paradigma 7: “e ancora un po’ di regolarità in più... le funzioni derivabili....”**  
 (24 - 28 ottobre 2022)

7.1) a) Determinate l’ordine di infinitesimo e la parte principale rispetto all’infinitesimo campione  $g(x) = x$ , per  $x \rightarrow 0$  delle seguenti funzioni:

i)  $\cos x^2 - 1$ ;      ii)  $\sin \sqrt[3]{x}$ ;      iii)  $e^{2x} - 1$ ;      iv)  $2x^2 - 3x^3$ .

b) Rappresentate il grafico delle funzioni nel punto a) in un intorno di 0.

[Soluzione](#)

7.2) Calcolate, dove esiste, la derivata prima delle seguenti funzioni:

$$\frac{x+2}{\arctan(x^2+1)}; \quad \sin \sqrt[3]{x^3+x^{-1}}; \quad xe^{\sqrt{x}+x}; \quad (1+\cos x)^x.$$

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x}; \quad x^{\frac{1}{x}}; \quad \log(2x\sqrt{1-x^2}) + 2\arccos \sqrt{1-x^2}.$$

[Soluzione](#) [Soluzione](#)

7.3) Dite se le seguenti affermazioni sono vere, citando teoremi visti a lezione oppure fornendo controesempi.

a) Se la funzione  $f$  è derivabile, allora la funzione  $|f|$  è derivabile.

b) Se la funzione  $f$  è derivabile, allora la funzione  $|f|$  è continua.

c) Se la funzione  $f^2$  è continua, allora la funzione  $f$  è continua.

d) Se la funzione  $|f|$  è continua, allora la funzione  $f$  è continua.

[Soluzione](#) [Soluzione](#)

7.4) Dite (prima di fare i conti!) quali delle seguenti funzioni non sono derivabili in  $x = 0$ :

$$|x|\arctan x; \quad x|\cos x|; \quad |x|\cos x; \quad \arctan \sqrt[3]{x}; \quad x\arctan \sqrt[3]{x}.$$

[Soluzione](#)

7.5) Siano  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  due funzioni derivabili tali che  $f(0) = \frac{\pi}{2}$ ,  $f'(0) = \frac{1}{2}$  e  $g(x) = \cos(f(x^2 - 1))$ . Determinate  $g'(1)$ .

[Soluzione](#)

7.6) Verificate che la funzione  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definita da  $f(x) = x^2 + \log x$  è biettiva. Determinate  $f^{-1}(e^2 + 1)$  e  $(f^{-1})'(e^2 + 1)$ .

[Soluzione](#)

7.7) Verificate che  $f(x) = \arctan(x^2 - 3x)$  soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle su  $[0, 3]$ . Determinate i punti  $c \in ]0, 3[$  tali che  $f'(c) = 0$ .

[Soluzione](#)

7.8) Verificate che  $f(x) = x|x|$  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange su  $[a, b] = [-1, 1]$ . Determinate i punti  $c \in ]-1, 1[$  tali che  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .

[Soluzione](#)

7.9) Dite quali delle seguenti funzioni sono monotone su tutto  $\mathbb{R}$ :

a)  $x + \sin x$ ;      b)  $x - \sin x^2$ ;      c)  $\sin(\arctan x)$ ;      d)  $(1+x^2)e^{-x}$ .

[Soluzione](#)

7.10) Dimostrate le seguenti diseguaglianze

$$\text{i)} \quad \forall x > 0 \quad \frac{x-1}{x} \leq \log x \leq x-1; \quad \text{ii)} \quad \forall x < 1 \quad e^x \leq \frac{1}{1-x}.$$

**Soluzione**

7.11) Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile. Provate che  $f$  pari (dispari) implica  $f'$  dispari (pari).

**Soluzione**

7.12) (MOLTO UTILE NEGLI ESERCIZI PER IL CALCOLO DI  $f'(x_0)$  - Corollario di Lagrange)

Siano  $x_0 \in \mathbb{R}$  e  $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ . Sia  $f : [x_0, x_0 + \delta] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua su  $[x_0, x_0 + \delta]$ , derivabile su  $]x_0, x_0 + \delta[$  e tale che esiste  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ . Provate che allora esiste la derivata di  $f'_+(x_0)$  e si ha

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x).$$

Nota: Analogamente per la derivata sinistra e per la derivata (scrivete voi l'enunciato in questi casi)!!!

**Soluzione**

$$7.13) \quad \text{Sia } f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

a) Dite se siete nelle ipotesi dell'esercizio precedente per ottenere che  $f$  è derivabile in  $x_0 = 0$ .

b) Provate, usando la definizione, che  $f$  è derivabile in  $x_0 = 0$  e determinate  $f'(0)$ .

**Soluzione**

$$7.14) \quad \text{i) Per quali valori del parametro } \alpha \in \mathbb{R} \text{ la funzione } f(x) = \begin{cases} x^3 + \alpha \sin x & \text{se } x < 0 \\ \log(1 + 3x) & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

risulta derivabile in  $x_0 = 0$ ?

ii) Determinate i valori dei parametri  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tali che la funzione  $f : ]-1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  definita da

$$f(x) = \begin{cases} \log_3(x+1) & \text{se } -1 < x \leq 0 \\ \alpha \sin x + \beta \cos x & \text{se } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ x & \text{se } x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

risulti continua su tutto  $] -1, +\infty[$ . Verificate se per tali valori di  $\alpha$  e  $\beta$  la funzione è anche derivabile.

iii) Determinate i valori dei parametri  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  per i quali la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \alpha \sin x + \beta e^x & \text{se } x < 0 \\ \arcsin(\alpha x^2 + x) - 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

sia continua e derivabile in  $x_0 = 0$ .

**Soluzione Soluzione Soluzione**

7.15) Date un esempio di funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile e continua in un solo punto.

**Soluzione**

7.16) Sia  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile in un punto  $x_0 \in ]a, b[$  per il quale  $f(x_0) = 0$  e  $f'(x_0) \neq 0$ . Per quali valori di  $\alpha > 0$  è derivabile in  $x_0$  la funzione  $|f(x)|^\alpha$ ? Che cosa succede se  $f'(x_0) = 0$ ?

**Soluzione**

7.17) a) Trovate una funzione derivabile  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tale che  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ , ma  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

b) Trovate una funzione derivabile  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  per la quale esiste finito il  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ma non esiste  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ .

**Soluzione**

7.18) (Teorema di Rolle generalizzato) Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione derivabile tale che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Provate che esiste  $c \in \mathbb{R}$  tale che  $f'(c) = 0$ .

[Soluzione](#)

7.19) Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione derivabile. Dimostrate che se  $f'(a) < \lambda < f'(b)$  allora esiste almeno un punto  $c \in ]a, b[$  tale che  $f'(c) = \lambda$  (Suggerimento: ridursi al caso  $\lambda = 0$  mediante la funzione  $g(x) = f(x) - \lambda x$ ).

[Soluzione](#)

7.20) Siano  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funzioni derivabili tali che

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) \neq 0.$$

Provate che se  $f(x_1) = f(x_2) = 0$  con  $x_1 < x_2$  allora esiste  $\xi \in ]x_1, x_2[$  tale che  $g(\xi) = 0$  (cioè tra due zeri di  $f$  cade almeno uno zero di  $g$  (Suggerimento: considerate la funzione  $\frac{f}{g}$ )).

[Soluzione](#)