

COGNOME E NOME: \_\_\_\_\_

MATRICOLA: 

--	--	--	--	--	--

Lasciare vuote le tabelle seguenti.

Esercizio	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Punti	2	2	1½	3	1½	2	2	2	2
Punti ottenuti									

Esercizio	10	11	12	13	14	15	16		<b>Totale</b>
Punti	2	2	2	2	2	4	4		36
Punti ottenuti									

1. (2 punti) Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  non vuoto e limitato inferiormente.

Stabilite per ciascuna delle seguenti proposizioni se è vera o falsa.

- (a)  $\exists \bar{a} \in A : \forall a \in A, \bar{a} \leq a$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

- (b) Se  $l = \inf A$ , allora  $\forall a \in A, l < a$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

- (c) Se  $l = \inf A$ , allora  $\forall l' \in \mathbb{R} : l < l'$ ,  $\exists a \in A : a < l'$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

- (d) Se  $l \in \mathbb{R}$  è tale che  $\forall a \in A$  si ha  $l - \frac{1}{n} < a \ \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ , allora  $l = \inf A$ .  
 Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

2. (2 punti) Siano  $z_1$  e  $z_2$  le soluzioni in  $\mathbb{C}$  dell'equazione

$$z^2 - (1 - i)z = i.$$

Se  $\text{Im}z_1 = 0$ , allora  $z_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  e  $z_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

3. (1½ punti) Sia  $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$  e sia  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_{\geq 1}}$  la successione definita da

$$a_n = \frac{\left(3 - \frac{1}{n}\right)^n - 3^n}{e^{n \log \alpha}}.$$

Determinate, al variare di  $\alpha$ , il valore  $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ .

Risulta che  $L$  è finito e diverso da zero e uguale a  $\underline{\hspace{2cm}}$  se  $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4. (3 punti) Calcolate

$$L_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{4n} \frac{1}{\sqrt[3]{n^3 + k}}; \quad L_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(4n)^n - n^{2n}}{(n+2)^{2n} + (n+1)!}.$$

Allora  $L_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  e  $L_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

5. (1½ punti) Sia

$$l = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x - \sin \frac{1}{6x}) - \log x}{\frac{\arctan x^2}{x^2} + \frac{\log x}{x^3}}$$

Allora si ha  $l = \underline{\hspace{2cm}}$ .

6. (2 punti) Sia

$$A = \left\{ (-1)^n \frac{4}{\pi} \arctan\left(1 - \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{N}_{\geq 1} \right\}.$$

Stabilite per ciascuna delle due affermazioni se è vera o falsa.

- (a) L'unico punto di accumulazione per  $A$  è 1.  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

- (b) L'insieme  $A$  è costituito solo da punti isolati.  Vera  Falsa

- (c) Si ha  $\inf A = \underline{\hspace{2cm}}$ . Esso è minimo?  Sì  No

Perché? \_\_\_\_\_

- (d) Si ha  $\sup A = \underline{\hspace{2cm}}$ . Esso è massimo?  Sì  No

Perché? \_\_\_\_\_

7. (2 punti) Sia  $f : [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R}$  una qualunque funzione continua con  $f(-1) = -1$  e  $f(0) = 0$ . Allora la funzione  $g(x) = \alpha x^3 + \beta$  interseca necessariamente il grafico di  $f$  nell'intervallo  $[-1, 0]$  per

- $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{2}$    $\alpha = 1, \beta = -1$    $\alpha < \frac{3}{4}, \beta = -\frac{1}{4}$    $\alpha = \frac{3}{4}, \beta = -\frac{1}{4}$

8. (2 punti) Sia  $f(x) \sim x^2$  per  $x \rightarrow +\infty$  e  $g(x) \sim 3x$  per  $x \rightarrow +\infty$ .

Stabilite per ciascuna delle seguenti affermazioni se è vera o falsa.

- (a)  $f(x) + g^2(x) \sim 10x^2$  per  $x \rightarrow +\infty$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

- (b)  $g(x) = o(x\sqrt{x})$  per  $x \rightarrow +\infty$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

- (c)  $f(x) - x^2 = o(1)$  per  $x \rightarrow +\infty$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

9. (2 punti) Sia  $f(x) = \arcsin x^2 + \log(\cos x)$  per  $x$  in un intorno di 0.

(a) Determinate  $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$  tale che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^\alpha}$$

esiste finito diverso da 0. Allora  $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(b) La parte principale dell'infinitesimo  $f(x)$ , rispetto all'infinitesimo campione  $x$ , per  $x \rightarrow 0^+$  risulta  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

10. (2 punti) Siano  $\alpha$  e  $\beta$  i due numeri reali positivi per i quali la funzione

$$f(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^3 + e^x & \text{se } x \leq 0 \\ \sin(\beta x) + \alpha \log(x + e) & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

risulta derivabile in  $x_0 = 0$ . Allora  $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$  e  $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ .

11. (2 punti) Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{se } x \leq -1 \\ 2 - \frac{2}{\pi} \arcsin |x| & \text{se } -1 < x < 1 \\ e^{-x+1} & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Stabilite per ciascuna delle seguenti tre affermazioni se è vera o falsa.

(a)  $x = 0$  è un punto di massimo locale per  $f$ , ma non di massimo assoluto.  Vera  Falsa

(b)  $x = 1$  è un punto di continuità, ma non è un punto di estremo.  Vera  Falsa

(c)  $f$  soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle su  $[-1, 1]$ .  Vera  Falsa

Perché?  $\underline{\hspace{10cm}}$

La funzione  $g = f|_{[1, +\infty[}$  è invertibile. Allora  $g^{-1}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$  per ogni  $x \in I$ , con  $I = \underline{\hspace{2cm}}$

12. (2 punti) Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la funzione definita da  $f(x) = x - 1 + 3 \arctan(x - 1)$ .

(a) Dite perchè  $f$  ammette funzione inversa continua e derivabile da  $\mathbb{R}$  in  $\mathbb{R}$ .

Perché?  $\underline{\hspace{10cm}}$

(b) Si ha  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}\left(\frac{e^x - x}{1 + x^2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$

(c) Si ha  $(f^{-1})'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

13. (2 punti) Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{\sin x}{\sqrt{x}} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0. \end{cases}$$

Stabilite per ciascuna delle seguenti quattro affermazioni se è vera o falsa.

- (a)  $f$  ha un asintoto obliqua per  $x \rightarrow +\infty$ .  Vera  Falsa  
 (b)  $f$  ha un asintoto verticale in  $x = 0$ .  Vera  Falsa  
 (c)  $f$  non è derivabile in  $x_0 = 0$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

- (d)  $f$  è derivabile in  $x_0 = 0$  e  $f'(0) = 0$ , perchè  $f$  è costante in  $x_0 = 0$ .  Vera  Falsa

Perché? \_\_\_\_\_

14. (2 punti) Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione derivabile. Stabilite per ciascuna delle seguenti affermazioni se segue dalle ipotesi.

- (a) Se  $f$  è 1-periodica, allora per ogni  $x \in \mathbb{R}$  esiste un punto critico per  $f$  in  $\left]x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right[$ .  
 Sì  No

Perché? \_\_\_\_\_

- (b) Se  $f$  è dispari e  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| = 1$ , allora  $|f(x)| \leq |x|$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .  
 Sì  No

Perché? \_\_\_\_\_

Per i seguenti DUE esercizi è richiesto UN ACCURATO SVOLGIMENTO sui fogli a quadretti.

15. (4 punti) Determinate le soluzioni  $(z, w) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$  del sistema di equazioni

$$\begin{cases} \bar{z}w = -i \\ |z|^2\bar{w} - 2z = -3. \end{cases}$$

Scriveteli in forma algebrica e rappresentatele nel piano complesso.

16. (4 punti) Sia  $(a_n)_n$  la successione definita per ricorrenza

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{2} \\ a_{n+1} = \frac{3}{2} - \frac{1}{1+a_n} \quad n \geq 0. \end{cases}$$

- (a) Provate, usando il principio di induzione, che  $\frac{1}{2} \leq a_n < 1$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ .  
 (b) Provate che  $(a_n)_n$  è strettamente crescente.  
 (c) Motivate l'esistenza del limite finito, per  $n \rightarrow +\infty$ , della successione  $(a_n)_n$  e determinatelo.